DESCRIPTION

D'UN

POISSON NOUVEAU RECUEILLI A LULUABOURG (CONGO BELGE)

PAR

G.-A. BOULENGER

Tilapia stigmatogenys, sp. n.

Hauteur du corps égale à la longueur de la tête, 3 fois dans la longueur totale. Tête près de deux fois aussi longue que large; museau arrondi, à profil droit ou un peu convexe, un peu plus large que long, aussi long ou un peu plus court que la partie postoculaire de la tête; œil mesurant les $^{2}/_{3}$ ou les $^{3}/_{4}$ de la longueur du museau, compris $3\ ^{1}/_{2}$ (jeune) à $4\ ^{1}/_{2}$ fois dans la longueur de la tête, égale à la largeur interorbitaire; bouche s'étendant jusqu'au-dessous du bord antérieur de l'œil; dents en 3 ou 4 séries, 40 à 50 à la série externe de la mâchoire supérieure; 4 ou 5 séries d'écailles sur la joue, la largeur de la région écailleuse égale au diamètre de l'œil. Branchiospines courtes, 7 ou 8 à la branche inférieure du premier arceau. Dorsale à 15 épines (rarement 16) et 9 ou 10 (rarement 8) rayons mous; épines égales en longueur à partir de la sixième, qui mesure le tiers de la longueur de la tête; les plus longs rayons mous mesurent les $^{3}/_{5}$ de la longueur de la tête. Anale à 7 rayons mous; la troisième épine de même longueur que les plus longues dorsales. Pectorale mesurant à peu près les $^{2}/_{3}$ de la longueur de la tête, n'atteignant pas l'anale. Ventrale s'étendant jusqu'à l'anus. Caudale arrondie. Pédicule caudal aussi long que haut ou un peu plus haut que long. Écailles à bord finement denticulé, $27 - 29\ \frac{2-3}{10-11}$; lignes latérales $\frac{18-21}{10\ 12}$. Brunâtre en dessus, blanc en dessous, uniforme ou avec 7 ou

8 bandes verticales foncées assez indistinctes; une tache operculaire noirâtre; une ou deux bandes foncées en travers du dessous de la tête, une autre, oblique, de l'œil à la bouche; généralement une tache noire sur le menton; dorsale épineuse grisâtre, à taches claires arrondies; dorsale molle jaune à barres noirâtres obliques; anale jaune, noirâtre vers le bord libre; caudale jaune à petites taches noirâtres arrondies.

Cette espèce nouvelle, voisine de *T. Stormsi* Bgr., est représentée par de nombreux individus, dont le plus grand mesure 105 millimètres.

Ces individus faisaient partie d'une petite collection de Poissons recueillie à Luluabourg (Congo belge) par le R. P. Callewaert et envoyée par lui au Musée de Tervueren.